



Samenvatting Soortenstandaard

Rugstreepad

Deze samenvatting geeft de belangrijkste punten uit de soortenstandaard, die is opgesteld in het kader van de Flora- en faunawet. Op 1 januari 2017 is de Flora- en faunawet vervangen door de Wet natuurbescherming. De provincies gebruiken voorlopig nog deze soortenstandaards als richtlijn. Op den duur vervangt Bij12 (de uitvoeringsorganisatie van de provincies) deze soortenstandaards door *factsheets*. Regelink Ecologie & Landschap stelt te zijner tijd ook van deze *factsheets* overzichtelijke samenvattingen beschikbaar.

1. Ecologische informatie

De rugstreepad is iets kleiner dan de gewone pad en heeft een lichte rugstreep. Het is een pioniersoort die vooral voorkomt op plaatsen met vergraafbaar zand, zoals duinen, afgravingen en bouwterreinen. Voortplanting vindt overwegend in ondiepe, tijdelijke plassen plaats. De rugstreepad komt verspreid over bijna heel Nederland voor en ontbreekt alleen in de provincie Groningen. Sinds 1950 is de verspreiding met 40% afgenomen en ook in deze eeuw neemt het aantal dieren af.

2. Bescherming

Rugstreepadden mogen het hele jaar door niet worden gedood of verontrust, en ook hun eieren, larven voortplantingswateren en vaste rust- of verblijfplaatsen zijn beschermd. Ook in perioden waarin de dieren niet aanwezig zijn, mag hun leefgebied niet ongeschikt gemaakt worden of verloren gaan. Om dit te voorkomen, kan in bepaalde gevallen gewerkt worden volgens een goedgekeurde gedragscode. Als te verwachten is dat bij een ingreep verstoring van dieren of hun leefgebied zal plaatsvinden moet een ontheffing van de Wet natuurbescherming worden aangevraagd. Deze wordt verleend als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan en de ingreep een wettelijk erkend belang dient. Vooraf moet vrijwel altijd onderzoek plaatsvinden naar de situatie ter plekke.

3. Onderzoek

Aanwezigheid van de rugstreepad kan door een amfibiedeskundige worden vastgesteld aan de hand van:

- luisteren naar kooractiviteit tijdens drie veldbezoeken (april, mei, half juli) (of minder als aanwezigheid bij eerste of tweede bezoek is vastgesteld) op relatief warme, windstille avonden,
- vangen van eiersnoeren of larven met behulp van een steeknet (juni-juli),
- zoeken naar volwassen dieren gedurende vijf ronden (of minder als aanwezigheid is vastgesteld), 's nachts met zaklamp of overdag onder van te voren uitgelegde plaatjes.

De verschillende functies die een gebied voor de soort kan vervullen, moeten worden vastgesteld of op basis van *expert judgement* worden ingeschat. Gebruik van bestaande gegevens kan hierbij zinvol zijn.

4. Beschermingsmaatregelen per activiteit

Ingrepen die nadelig kunnen zijn voor de rugstreeppad, zijn onder andere:

- schonen en baggeren van wateren,
- dempen van wateren,
- grootschalig grondverzet.

Werkzaamheden worden indien mogelijk buiten de voortplantingstijd (april – juli) uitgevoerd. Als dit niet mogelijk is, kunnen dieren en eieren worden verplaatst naar een ander geschikt water in de directe omgeving. Wanneer het verplaatsen direct na het wegvangen gebeurt, wordt de wet niet overtreden en is hiervoor geen ontheffing nodig. Een andere oplossing is het gefaseerd in tijd en ruimte werken door per jaar een ander deel te schonen of te baggeren.

Als een water gedempt wordt, moet tijdig (enkele weken van te voren) in de omgeving een nieuw water worden aangelegd. Het dempen moet plaatsvinden in de periode augustus – maart. Het kan nodig zijn volgens een ecologisch werkprotocol te werken, waarbij de werkzaamheden door een amfibiedeskundige moeten worden begeleid.

Bij grootschalig grondverzet kan het noodzakelijk zijn van te voren buiten de winterrustperiode (april – oktober) vervangend leefgebied te realiseren.